

ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گلنگ به مگس گلنگ (Diptera, Tephritidae)

صلاح الدین کمانگر*

مری پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان.

* مسئول مکاتبه salahkamangar@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۵/۱/۱۵ تاریخ پذیرش: ۹۵/۷/۲۴

چکیده

برای بررسی مقاومت تعداد ده ژنوتیپ گلنگ، شامل: "سینا"، "آلمانه درشت"، "محلی مرند"، "IL111"، "محلی اصفهان"، "۴۱۱"، "سیریان"، "لساخ"، "دینسر" و "S-541" در کشت پاییزه، به مگس گلنگ، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه سنتنج در طی دو سال زراعی (۹۰-۹۱) و (۹۱-۹۲) انجام شد. در این آزمایش شاخص‌های شدت و میزان آلودگی، خسارتمانی، عملکرد، وزن هزار دانه و درصد روغن در کرت‌های مختلف، محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس درصد غوزه‌های آلوده، تعداد لارو-شفیره، درصد و تعداد بذور صدمه دیده، وزن هزار دانه، درصد روغن دانه و عملکرد محصول بیانگر وجود اختلاف آماری معنی‌دار در سطح یک درصد بین تیمارهای آزمایشی بود. بر اساس مقایسه‌ی میانگین داده‌ها، ژنوتیپ‌های "محلی اصفهان" و "لساخ" بیشترین و ژنوتیپ "سیریان" کمترین درصد غوزه‌های آلوده را دارا بودند. همچنین ژنوتیپ‌های "محلی اصفهان" بیشترین و "محلی مرند" کمترین تعداد لارو و شفیره را در غوزه داشتند. از نظر درصد بذور صدمه دیده، ژنوتیپ "لساخ" از سایر ژنوتیپ‌ها حساس‌تر بود و به لحاظ تعداد بذور صدمه دیده، ژنوتیپ "محلی اصفهان" بیشترین و ژنوتیپ‌های "سیریان" و "محلی مرند" کمترین تعداد بذور صدمه دیده را داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده، ژنوتیپ‌های مورد بررسی در دو گروه اصلی قرار گرفتند. گروه اول که کمترین درصد غوزه‌های آلوده، کمترین تعداد لارو و شفیره در غوزه و پایین‌ترین درصد و تعداد بذور صدمه دیده را دارا بودند و می‌توان آن‌ها را به طور نسبی مقاوم به مگس گلنگ برشمود که شامل ژنوتیپ‌های: "سیریان"، "محلی مرند"، "سینا"، "۴۱۱" و "IL111" بودند و در بین آن‌ها رقم "سیریان" و ژنوبیپ "محلی مرند" مقاوم‌تر بودند. گروه دوم که بیشترین درصد غوزه‌های آلوده، بیشترین تعداد لارو و شفیره در غوزه و بالاترین درصد و تعداد بذور صدمه دیده را دارا بوده و می‌توان آن‌ها را حساس به مگس گلنگ در نظر گرفت، عبارت بودند از: ژنوتیپ‌های "محلی اصفهان"، "لساخ"، "S-541"، "دینسر" و "آلمانه درشت" که در این بین، ژنوتیپ‌های "محلی اصفهان" و "لساخ" از بقیه حساس‌تر بودند.

واژه‌های کلیدی: گلنگ، ژنوتیپ، مقاومت، مگس گلنگ.

عوامل مهم در جلوگیری از توسعه‌ی کشت این محصول نه تنها در استان کردستان، بلکه در کل کشور مطرح می‌باشد. امروزه تنها روش مرسوم کنترل این آفت، روش شیمیایی می‌باشد که در دراز مدت موجب آلودگی‌های زیست محیطی، ایجاد نژادهای مقاوم آفت به آفت‌کش‌ها، نابودی تنوع زیستی و مشکلات عدیده دیگر می‌گردد. از آنجا که استفاده از ارقام مقاوم، به عنوان یکی از روش-

مقدمه

از جمله عوامل محدود کننده‌ی تولید محصولات کشاورزی و به ویژه دانه‌های روغنی، حشرات آفت می‌باشند که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر کمیت و کیفیت محصول تأثیر سوء می‌گذارند. مگس گلنگ Acanthiophilus helianthi Rossi به عنوان یکی از آفات اصلی گلنگ Carthamus tinctorius و از جمله

گردید ولی امروزه به اکثر نقاط کشت گلنگ گسترش یافته و هر ساله بر علیه آفت، سمپاشی صورت می‌گیرد و همین امر می‌تواند موجب ظهور جمعیت‌های مقاوم به حشره‌کش‌ها شده و در نتیجه کارایی حشره‌کش‌ها در کنترل آفات را کاهش می‌دهد (طالبی جهرمی، ۱۳۹۰).

گونه‌های وحشی جنس *Carthamus* دارای مجموعه غنی از ژن‌های مقاومت برای مقابله با تنش‌های محیطی زنده و غیر زنده می‌باشند که لازم است مورد استفاده قرار گیرند. بررسی‌ها نشان داده است که گونه‌های گلنگ دارای چندین ژن مطلوب مثل تحمل به خشکی، تحمل به شکستگی، فقدان خواب بذر، مقاومت به مگس گلنگ و بیماری‌های زنگ، لکه برگی *Ramularia* و سفیدک پودری و توکوفرول^۱ بالا می‌باشند (سوجاتا، ۲۰۰۸).

در مورد واکنش ارقام مختلف گلنگ به مگس گلنگ، مطالعاتی صورت گرفته است. بر اساس مطالعات فتحی و همکاران (۱۳۹۴)، ژنوتیپ‌های مختلف گلنگ بر رشد جمعیت مگس گلنگ و میزان خسارت وارد شده توسط آن اثر می‌گذارند، به طوری که در بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه، کمترین تراکم جمعیت لاروها و شفیره‌ها به ترتیب در ژنوتیپ‌های گلدشت و لاین ۴۱۱ مشاهده گردید و ارزیابی شاخص‌های خسارت نیز بیانگر پایین بودن میزان خسارت این مگس در ژنوتیپ‌های مذکور بود.

بررسی مقاومت تعداد ۱۰ لاین گلنگ در پاکستان نشان داده که لاین‌های 'PI-253560' و 'PI-253900' به حمله‌ی این مگس بسیار حساس بودند و لاین‌های 'PI-199874' و 'PI-340096' نسبت به سایر لاینهای مقاومت بودند (تالپور و همکاران، ۱۹۹۵). در بررسی مقاومت ارقام مختلف گلنگ به مگس گلنگ مشخص گردید که بین پارامترهای رشدی جمعیت این آفت در ارقام مختلف اختلاف معنی‌دار وجود دارد و بالاترین میانگین جمعیت مگس گلنگ در رقم 'GS/1PI-253894'^۲ بود (ممون، ۲۰۰۵). ارزیابی مقاومت ۵ رقم گلنگ به مگس (ممون، ۲۰۰۵). ارزیابی مقاومت بین ۵ رقم گلنگ به مگس گلنگ در پاکستان نشان داد که میزان حساسیت هر یک از ارقام مورد آزمایش نسبت به این آفت متفاوت بود و رقم 'PI-304498' با میانگین ۱/۸۴ مگس در هر بوته،

های موثر کنترل این آفت مطرح می‌باشد، بررسی میزان مقاومت و واکنش ژنوتیپ‌های مختلف گلنگ به مگس گلنگ و در نهایت شناسایی ژنوتیپ‌های مقاوم می‌تواند راه را برای شناسایی ژن‌های مقاومت و انتقال این ژن‌ها به ارقام پر محصول تجاری هموار نموده و بدین ترتیب رویکرد جدیدی برای مدیریت این آفت فراهم شود.

بررسی‌ها نشان داده است که موطن اصلی گلنگ، کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران می‌باشد. بومی بودن این گیاه و سازگاری آن با شرایط اقلیمی این کشور از جمله امتیازات آن در ایران محسوب می‌شود. با این حال برخی مشکلات تولید از جمله حساسیت این گیاه به برخی بیماری‌ها و آفات منجر به محدودیت تولید آن شده است (شیرانی راد و دهشیری، ۱۳۸۱). تحقیقات وسیعی بر روی حشرات آفت این محصول در نقاط مختلف جهان انجام شده و تقریباً در تمامی مطالعات، مگس گلنگ به عنوان یکی از آفات اصلی گلنگ معرفی گردیده است (عباس و عبدالmessیح، ۱۹۷۸؛ حجازی و مورسی، ۱۹۸۳؛ سینگ و داس، ۱۹۹۸). این حشره با تخریزی در غوزه‌ها و در نتیجه تغذیه لاروها از دانه‌ها و نهنج، کاهش قابل ملاحظه‌ای را در میزان تولید و روغن استحصالی ایجاد می‌کند. به گونه‌ای که در تحقیق ورما و همکاران (۱۹۷۴)، مشخص گردید که اگر کنترل مؤثری بر علیه این آفت صورت گیرد، عملکرد محصول تا ۴۰۰ درصد قابل افزایش می‌باشد. در بررسی دیگری در مورد ارزیابی میزان خسارت ناشی از مگس گلنگ، نشان داده شده که میزان روغن بذور آلوده ۲۱/۸ درصد در مقایسه با ۳۷/۸ درصد در بذور سالم بوده است (عباس و عبدالmessیح، ۱۹۷۸). یک مطالعه انجام شده در اصفهان نشان داد که خسارت این آفت در طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ در کبوتر آباد ۲۵٪؛ در اردستان ۵٪ و در اسلام آباد ۷۰٪ بود و در منطقه ورزنه، در اواخر فصل خسارت مگس گلنگ به بیش از ۸۵٪ رسید (باقری و نعمت‌اللهی، ۱۳۸۵). در مطالعه‌ای دیگر، میزان خسارت این آفت روی ارقام مختلف گلنگ بین ۳۰ تا ۷۰ درصد گزارش شده است (سیزعلیان و همکاران، ۲۰۱۰). این آفت در ایران اولین بار در سال ۱۳۴۴ در مزرعه‌ای متعلق به مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج مشاهده

^۱Tocopherol

اصفهان" ، "۴۱۱" ، "سیریان" ، "لسف" ، "دینسر" و "S-541" ، از بخش دانه های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر دریافت شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و ۲ سال زراعی (۹۰-۹۱ و ۹۱-۹۲) انجام شد. عملیات تهیه زمین شامل شخم عمیق پاییزه و دیسک قبل از کاشت در اوایل مهر ماه انجام گردید و به منظور کنترل علف های هرز، از امولسیون ۴۸ درصد ترفلان به میزان دو لیتر در هکتار استفاده شد و کوددهی بر اساس آزمون خاک انجام شد. کشت به صورت ردیفی با فاصله ردیف ۴۰ سانتیمتر و هر کرت شامل شش ردیف کشت پنج متری بود. به منظور سبز شدن مزرعه و جلوگیری از سله بستن زمین، اولین آبیاری پس از کشت به صورت آبیاری بارانی سبک و آبیاری های بعدی بر اساس نیاز انجام شد. کنترل علف های هرز به روش وجین دستی و پس از سبز شدن گلنگ انجام گرفت. طبق بازدیدهای انجام شده، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۲ تمامی ژنوتیپ ها بجز محلی اصفهان در مرحله گل قرار داشتند، دو هفته بعد یعنی در تاریخ هشت تیرماه نمونه برداری از کرتهای شروع شد. نمونه برداری از ژنوتیپ محلی اصفهان در مورخه ۲۰ تیرماه انجام شد. تعداد نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:

$$N = \frac{(1.96/D)^2}{(S/\bar{x})^2} \quad (1)$$

که در آن N تعداد نمونه، D سطح دقت آزمایش ($0/25$)، S انحراف معیار داده های نمونه برداری اولیه و \bar{x} میانگین داده های نمونه برداری اولیه می باشد (ساوث وود و هندرسون، ۲۰۰۰). برای نمونه برداری از هر کرت، ۵۰ غوزه به صورت تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه پس از شکافت غوزه ها، درصد غوزه های آلوه، تعداد لارو و شفیره موجود در غوزه ها (شدت آلوه) درصد بذور سالم، وزن دانه های صدمه دیده در ۵۰ غوزه، تعداد دانه های صدمه دیده و وزن هزار دانه ثبت شد. پس از رسیدن کامل محصول، حذف ردیف های کناری و نیم متر حاشیه از بالا و پایین طرح، عملکرد اندازه گیری شد. وزن هزار دانه هر کرت با محاسبه میانگین تعداد شش نمونه ۱۰۰ تایی از بذور

تقریباً از ارقام دیگر مقاومت بود و به دنبال آن، ارقام ۲/۴۵' PI-304507' (۲/۱۱) مگس در بوته، ۷۸' Thiri-PI-386172' (۲/۵۵) مگس در بوته، ۲/۶' PI-170274' (۲/۶) مگس در بوته) قرار گرفتند (یوجان، ۲۰۰۷).

بررسی های سبزعلیان و همکاران (۱۳۸۷) نشان داد که با توجه به مقاومت نسبی گلنگ وحشی نسبت به گلنگ اهلی به مگس گلنگ و تلاقی پذیر بودن این دو گونه امکان ایجاد مقاومت ژنتیکی در گلنگ اهلی با استفاده از زمینه ژنتیکی گلنگ وحشی وجود دارد. جمعیت مگس به طور چشمگیری در توده وحشی به علت مرگ و میر لاروها و احتمالاً آنتی بیوز کاهش یافته بود. یک رابطه قوی بین رنگ پوشش بذر قهوه ای تا سیاه و مقاومت به مگس گلنگ وجود داشت و این امر نشان می دهد که امکان استفاده از این صفت در برنامه های اصلاحی گلنگ به منظور توسعه ارقام مقاوم به مگس گلنگ وجود دارد (سبزعلیان و همکاران، ۲۰۱۰).

بررسی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گلنگ به مگس گلنگ در کشت بهاره در اصفهان نشان داد که از نظر درصد بذور صدمه دیده، ژنوتیپ ها در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول با حداقل میانگین آلوه غوزه ها شامل: اصفهان-۱۴' و IL111' و گروه دوم با حداقل میانگین آلوه غوزه ها شامل: اراک ۲۸۱۱' و P.I. بودند (نعمت الهی و شهسواری، ۱۳۸۷).

بررسی های انجام شده در استان کردستان نشان داد که بین فصول کشت گلنگ (کشت بهاره و پاییزه) از نظر میزان و شدت آلوه این محصول به مگس گلنگ، تفاوت معنی داری وجود نداشت اما با وجود این، عملکرد محصول در تیمارهای کشت شده در پاییز بیشتر از کشت بهاره بود و به همین دلیل کشت پاییزه ارقام گلنگ در استان کردستان قابل توصیه می باشد (کمانگر و همکاران، ۱۳۸۹) بر همین اساس در این تحقیق، تعدادی از ژنوتیپ های گلنگ از نظر مقاومت به مگس گلنگ در کشت پاییزه با هم مقایسه شدند.

مواد و روش ها

بذور تعداد ۱۰ ژنوتیپ گلنگ به نام های: "سینا"، "آلمانه درشت"، "محلی مرند"، "IL111"، "محلی

نتایج به دست آمده از صفاتی که بیشتر توسط مگس گلنگ تحت تاثیر قرار می‌گرد شامل: درصد غوزه‌های آلوده، تعداد لارو و شفیره در غوزه و درصد و تعداد بذور صدمه دیده، نشان داد که ارقام و ژنوتیپ‌های مورد بررسی در دو گروه اصلی قرار گرفتند. گروه اول که کمترین درصد غوزه‌های آلوده، کمترین تعداد لارو و شفیره در غوزه و پایین‌ترین درصد و تعداد بذور صدمه دیده را دارا بودند و می‌توان آن‌ها را به طور نسبی مقاوم به مگس گلنگ در نظر گرفت. شامل ارقام "سیریان"، "محلى مرند"، "سینا"، "۴۱۱" و "IL111" بودند و در بین آن‌ها رقم "سیرین" و ژنوبیپ "محلى مرند"، مقاومتر ظاهر شدند. گروه دوم که بیشترین درصد غوزه‌های آلوده، بیشترین تعداد لارو و شفیره در غوزه و بالاترین درصد و تعداد بذور صدمه دیده را دارا بودند و می‌توان آن‌ها را حساس به مگس گلنگ در نظر گرفت عبارت بودند از: ارقام "محلى اصفهان"، "لسف"، "S-541"، "دینسر" و "آلمانه درشت" که در این بین، "ارقام محلى اصفهان" و "لسف" از بقیه حساس‌تر بودند. نتایج این تحقیق با نتایج سایر محققان از جمله: سبزعلیان و همکاران (۱۳۸۷)، نهمت‌الهی و شهسواری (۱۳۸۷)، فتحی و همکاران، (۱۳۹۴)، تالپور و همکاران (۱۹۹۵)، ممون، (۲۰۰۵)، یوجان (۲۰۰۷) مبنی بر متفاوت بودن مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گلنگ نسبت به مگس گلنگ و در نتیجه تاثیر متفاوت بر رشد جمعیت مگس گلنگ و میزان خسارت وارد توسط آن، مطابقت دارد.

با توجه به اینکه کلیه عملیات زراعی انجام شده از جمله شخم، کوددهی، آبیاری و همچنین شرایط آب و هوایی و نوع خاک و سایر عوامل برای کلیه ژنوتیپ‌های مورد مطالعه، یکسان بوده، بعيد به نظر می‌رسد که مقاومت مشاهده شده، یک مقاومت اکولوژیکی باشد. از نظر خصوصیات زراعی مانند زود رسی، دیر رسی، ارتقاء، بیوماس و رنگ بذور، تفاوت چندانی بین ژنوتیپ‌ها وجود نداشت (به غیر از ژنوتیپ محلی اصفهان، که زمان گله‌ی آن دیرتر از سایر ژنوتیپ‌ها بود)، همچنین خاردار، یا بی‌خار بودن ژنوتیپ‌ها در مقاومت و یا حساسیت آنها تاثیری نداشت، لذا احتمالاً مقاومت مشاهده شده، از

برداشت شده آن کرت تعیین گردید. از هر کرت مقدار ۱۲۰ گرم بذر به معاونت تحقیقات کشاورزی دیم سارارود ارسال شد تا درصد روغن آنها تعیین شود. داده‌های بدست آمده با نرم افزار MSTAT-C تجزیه و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون توکی^۱ انجام شد.

نتایج و بحث

به دلیل سرمازدگی شدید مزرعه آزمایشی در سال نخست تحقیق، جمع‌آوری داده‌های مورد نظر میسر نگردید و فقط در سال دوم اجرای طرح، جمع‌آوری داده انجام گردید.

نتایج تجزیه واریانس داده‌های بدست آمده در مورد درصد غوزه‌های آلوده، تعداد لارو، شفیره، درصد و تعداد بذور صدمه دیده، وزن هزار دانه، درصد روغن دانه و عملکرد محصول بیانگر وجود اختلاف آماری معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد بین تیمارهای آزمایشی بود (جدول ۱).

بر اساس مقایسه میانگین داده‌ها (جدول ۲)، ارقام "محلى اصفهان" و "لسف" بیشترین و "سیریان" کمترین درصد غوزه‌های آلوده را دارا بودند. همچنین "ارقام محلی اصفهان" بیشترین و رقم "محلى مرند" کمترین تعداد لارو و شفیره در غوزه را داشتند. از نظر درصد بذور صدمه دیده رقم "لسف" از سایر ارقام حساس‌تر بود و به لحاظ تعداد بذور صدمه دیده، "محلى اصفهان" بیشترین و "سیریان" و ژنوتیپ "محلى مرند" کمترین تعداد بذور صدمه دیده را داشتند. بر اساس داده‌های به دست آمده، رقم "۴۱۱" بیشترین و رقم "دینسر" کمترین وزن هزار دانه را دارا بودند. بیشترین درصد روغن مربوط به رقم "سینا" و کمترین مقدار آن متعلق به ارقام "۴۱۱" و "لسف" بود. از لحاظ عملکرد دانه نیز رقم "IL111" بیشترین و ارقام "دینسر"، "محلى اصفهان" و "لسف" کمترین عملکرد را داشتند، هر چند که به نظر می‌رسد صفات وزن هزار دانه، درصد روغن و عملکرد بیشتر تحت تاثیر فیزیولوژی ارقام باشد تا مگس گلنگ.

¹Tukey

جدول ۱ - تجزیه واریانس داده‌های بدست آمده در ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ.

ضریب تغییرات (%)	P	F	میانگین مربعات	درجه آزادی خطا	درجه آزادی تیمار	فاکتورهای ارزیابی شده
۱۲/۲۵	۰/۰۰۶۲	۳/۹۷۴۷**	۲۵۱/۶۱۵	۱۸	۹	درصد غوزه‌های آلوده
۲۰/۴۳	≤۰/۰۰۰۱	۱۰/۶۱۹**	۱۷۴/۹۷۸	۱۸	۹	تعداد لارو-شفیره در غوزه
۳۱/۰۲	۰/۱۱۳۱	۱/۹۲۶*	۳۸/۱۱۵	۱۸	۹	درصد بذور صدمه دیده
۳۴/۷۴	۰/۰۵۲۷	۲/۴۲۱۹**	۱۱۴۶۵/۵۱۵	۱۸	۹	تعداد بذور صدمه دیده
۶/۹۹	≤۰/۰۰۰۱	۱۲/۳۵۸**	۳۴/۸۳۲	۱۸	۹	وزن هزار دانه
۶/۱۸	۰/۰۹۱۸	۲/۰۵۹۲**	۴/۵۸۲	۱۸	۹	درصد روغن دانه
۴/۰۷	۰/۰۰۰۱	۵۹/۷۷۱**	۳۲۵۹/۱۳۵	۱۸	۹	عملکرد محصول

** وجود اختلاف معنی‌دار ($P < .001$)

این تحقیق)، هیچ گونه رابطه‌ای بین خاردار بودن ارقام و میزان مقاومت آن‌ها به مگس گلرنگ وجود نداشت به‌طوریکه ارقام " محلی اصفهان" و "لساف" که از بقیه حساس‌تر بودند، جزو ارقام خاردار هستند در حالیکه ارقام نسبتاً مقاوم "سیریان" و " محلی مرند" فاقد خار می‌باشند.

تجارب دو ساله اجرای پروژه مشخص نمود که بجز رقم "سینا"، سایر ارقام و ژنوتیپ‌های مورد بررسی، نسبت به سرما حساس بوده و برای کشت در غرب کشور قابل توصیه نیستند اما با توجه به مقاومت نسبی رقم "سیریان" و ژنوتیپ " محلی مرند" به مگس گلرنگ، انجام مطالعات تکمیلی و آزمایشگاهی روی این ژنوتیپ‌ها و بررسی ژن‌های مقاومت در آن‌ها و امکان انتقال آن به ارقام پرمحصول و مقاوم به سرما با استفاده از تکنیک‌های اصلاح نباتات، قابل توصیه بوده و می‌تواند منجر به ایجاد مقاومت ژنتیکی در گلرنگ نسبت به مگس گلرنگ گردد.

نوع آنتیزنفرز نبوده و با خصوصیات ریخت‌شناسی ژنوتیپ‌ها ربطی ندارد و تفاوت در تراکم جمعیت لارو-شفیره و میزان آلودگی و خسارت واردہ توسط آفت در بین ده ژنوتیپ مورد مطالعه گلرنگ در این تحقیق، می‌تواند بر اثر آنتی بیوز بوده و با مواد شیمیایی فرار جلب کننده، کیفیت تغذیه‌ای و مواد بازدارنده‌ی تغذیه‌ای گیاهان میزبان در ارتباط باشد (پرایس، ۱۹۹۷؛ جاخمولا و یاداو، ۱۹۸۰). در مورد ژنوتیپ محلی اصفهان که بیشترین درصد غوزه‌های آلوده، بیشترین تعداد لارو و شفیره در غوزه و بالاترین درصد و تعداد بذور صدمه دیده و کمترین عملکرد را داشته، به نظر می‌رسد که یک رابطه‌ی قوی بین حساسیت این ژنوتیپ و دیررسی آن وجود داشته باشد.

در آزمایشاتی که به منظور ارزیابی تراکم جمعیت و خسارات مگس گلرنگ روی ده ژنوتیپ گلرنگ انجام شد، لاین' ۴۱۱، جزء ژنوتیپ‌های مقاوم که دارای پتانسیل کاربرد در برنامه‌های مدیریت تلفیقی مگس گلرنگ می‌باشد، معرفی گردید (فتحی و همکاران، ۱۳۹۴).

نتایج این بررسی نشان داد که علیرغم باور عمومی(حداقل در مورد ژنوتیپ‌های مورد بررسی در

کمانگر

جدول ۲ - میانگین صفات مورد بررسی و گروه بندی ترتیبی تیمارها

صفات مورد بررسی نام ژنتیپ‌ها	درصد غوزه‌های آلوده	درصد لارو-شفیره در دهه در ۵۰ غوزه	تعداد بذور صدمه در دهه در ۵۰ غوزه	وزن هزار دانه (گرم) در دهه در ۵۰ غوزه	تعداد بذور صدمه در دهه در ۵۰ غوزه	عملکرد (گرم/متر مربع)	درصد روغن دانه
							جوانگر
سینا	۵۶±۵/۸۹ bc*	۱۳/۶۷±۳/۸۶ def	۱۲/۴۸±۳/۱۶ b	۱۸۷/۳±۳۰/۴۷ abc	۲۳/۹۷±۰/۸۰ cd	۲۶/۲۵±۰/۸۶ a	۱۹۸/۵±۱۷/۱ c
آلمانه درشت	۶۴/۶۷±۱/۸۸ bc	۲۴/۳۳±۳/۷۷ bc	۱۳/۵۶±۲/۵۴ b	۱۵۱/۳±۳۹/۷۲ bc	۲۱/۲۲±۰/۷۱ def	۲۴/۷۳±۰/۵۷ abc	۱۹۸/۴±۲۳/۶ c
محلی مرند	۵۸/۶۷±۱/۸۹ bc	۹/۶۷±۳/۴۰ f	۱۱/۸±۰/۷۸ b	۱۳۵/۷±۱۰/۳۷ c	۲۳/۲۹±۱/۲۰ def	۲۴/۲۶±۰/۶۵ abc	۱۶۶/۱±۸/۴ e
IL111	۶۲/۶۷±۸/۴۷ abc	۱۹/۶۷±۴/۷۸ cd	۱۱/۵۳±۲/۰۵ b	۱۵۸±۵۸/۸ bc	۲۸/۶۴±۱/۵۵ ab	۲۳/۳۸±۰/۸۲ bc	۲۴۱/۵±۹/۷۲ a
محلی اصفهان	۸۱/۳۳±۰/۹۴ a	۲۴±۲/۹۴ a	۱۲/۱۳±۱/۶۸ b	۳۰/۵۵±۰/۶۰ ef	۳۰±۳۷/۴۸ a	۲۵/۱۰±۰/۵۵ ab	۱۴۴/۴±۳/۶ f
۴۱۱	۶۰±۵/۸۹ bc	۱۲/۳۳±۳/۳۰ ef	۱۲/۳۳±۱/۷۱ b	۱۵۸/۳±۴۳/۳۱ bc	۳۰/۳۷±۰/۹۹ a	۲۲/۴۱±۱/۸۷ c	۱۷۸/۷±۱۲/۴۶ de
سیریان	۵۴/۶۷±۶/۹۸ c	۱۷/۳۳±۲/۸۷ de	۱۱/۷۲±۱/۵۸ b	۱۳۷±۳۱/۰۱ c	۲۶/۳۸±۲/۵۰ bed	۲۴/۶۸±۱/۸۴ abc	۲۱۷±۲۵/۶ b
دینسر	۶۲/۶۷±۱/۸۸bc	۲۹/۶۷±۱/۷۰ cde	۱۶/۰۹±۱/۰۷ ab	۲۱۲/۷±۳۷/۹۸ ab	۲۱/۹۸±۰/۴۴ f	۲۲/۳۳±۰/۹۸ bc	۱۴۳/۱±۱۵/۹ f
لسا ف	۷۹/۳۳±۷/۷۲ a	۱۸±۲/۴۵ ab	۲۲/۳۲±۲/۳۷ a	۲۶۸±۴۸/۸۷ ab	۲۰/۵۴±۰/۷۳ def	۲۳/۳۶±۰/۴۸ c	۱۴۶/۱±۱۶/۴۷ f
S-541	۶۹/۳۳±۴/۱۱ ab	۲۰±۳/۲۷ cd	۱۸/۴۴±۳/۷ ab	۲۶۷±۷۱/۱۸ ab	۲۳/۴۲±۲/۱۵ de	۲۴/۶۹±۱/۶۹ abc	۱۸۱/۴±۲۶/۱ d

* حروف متفاوت در هر ستون نشانگر وجود اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۰.۵٪ در روش توکی می‌باشد.

سپاسگزاری

میسر نمی‌گردید. بدین وسیله به جهت همکاری مراکز
مذکور، مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام می‌دارم.

بی شک انجام این تحقیق بدون حمایت مالی
استانداری استان کردستان و همکاری بی دریغ مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان،

منابع مورد استفاده

باقری م ر و نعمت اللهی م ر، ۱۳۸۵. بیولوژی و میزان خسارت مگ گلنگ در استان اصفهان. خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. کرج. صفحه ۲۶۸.

سبزعلیان م ر، سعیدی ق، میرلوحی آ و حاتمی ب، ۱۳۸۷. ارزیابی جمعیت و خسارت مگ گلنگ (*Acanthiophilus helianthi*) روی ارقام گلنگ اهلی (*Carthamus tinctorius*) و واریته‌های گلنگ وحشی (*C. axyacantha* Boiss.). خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. همدان. صفحه ۲۸۳.

شیرانی راد، اح و ع دهشیری. ۱۳۸۱. راهنمای کلزا، کاشت، برداشت، نشر آموزش کشاورزی. ۱۱۳ صفحه طالبی جهرمی خ، ۱۳۹۰ . سمشناسی آفتکش‌ها؛ حشره‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها و موشکش‌ها. انتشارات دانشگاه تهران، ۵۰ ص.

فتحی ع، برخوردار ح و باقری م ر، ۱۳۹۴. ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت مگ گلنگ (*Acanthiophilus helianthi*) روی ده ژنوتیپ گلنگ. گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی). جلد ۲۸، شماره ۱. صفحه‌های ۱۱ الی ۲۲ کمانگر ص، جوزیان ع، کیهانیان ع و شریعتی ع، ۱۳۸۹. بررسی اثر تاریخ کشت در وضعیت و میزان خسارت مگ گلنگ (*Acanthiophilus helianthi* Rossi) در استان کردستان. خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. تهران. صفحه ۶۰۴.

نعمت اللهی م ر و شهسواری م ر، ۱۳۸۷. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گلنگ به مگس گلنگ در کشت بهاره در اصفهان. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. همدان. صفحه ۳۰۹.

Abbas SA and Abdul-Masih AM. 1978. On the life history of the safflower fly *Acanthiophilus helianthi* Rossi in Iraq. zeitschrift für angewandte entomologie. 83(2): 216-223.

Hejazi EM and Moursi KS, 1983. Studies on distribution and biology of the capsul fly *Acanthiophilus helianthi* Rossi, on wild plants in Egyptian Western desert. zeitschrift für angewandte entomologie. 96(4): 333-336.

Jakhmola SS and Yadav HS, 1980. Incidence of and losses caused by capsule fly, *Acanthiophilus helianthi* Rossi in different varieties of safflower. Indian Journal of Entomology, 42: 48-53.

Memon, Z.H. 2005. Cultivar resistance of safflower against some insect pests. SAU Tandojam (Pakistan). 49p.

Price PW. 1997. Insect ecology (3rd ed.). John Wiley and Sons, New York. 888pp.

Sabzalian MR, Saeidi G, Mirlohi A and Hatami B. 2010. Wild safflower species (*Carthamus oxyacanthus*): A possible source of resistance to the safflower fly (*Acanthiophilus helianthi*). Crop Protection. 29(6): 550- 555..

Southwood TRE and Henderson PA. 2000. Ecological Methods. Blackwell Science, USA, 575 pp.

- Sing RN and Dass R. 1998. Incidence of shoot fly *Acanthiophilus helianthi* Rossi in safflower under rainfed conditions at Dehli. Indian Journal of Entomology 44(4): 408-412.
- Sujatha M. 2008. Biotechnological interventions for genetic improvement of safflower. 7th International Safflower Conference. Wagga Wagga Australia.
- Talpur MA , Hussein T, Rustamani MA Gaad MA, Ahmad M and Shakoori AR. 1995. Relative resistance of safflower varieties to safflower shoot fly, *Acanthiophilus helianthi* Rossi(Diptera:Tephritidae). Proceeding of 15th Pakistan Congress of Zoology. 15: 177-181.
- Ujjan AM. 2007. Population of shootfly, *Acanthiophilus helianthi* rossi on different varieties of safflower. SAU Tandojam (Pakistan). 50p.
- Verma AN , Sing R and Mehrontra N. 1974. *Acanthiophilus helianthi* Rossi, a serious pest of safflower in Haryana. Indian Journal of Entomology. 34(4): 364-365.

Evaluation of Different Safflower Genotypes Resistance to Safflower Shootfly *Acanthiophilus helianthi* Rossi (Diptera, Tephritidae) in Autumn Sowing S Kamangar

Research instructor, Kurdistan Agricultural and Natural Recourses Research and Training Center.

*Corresponding author: salahkamangar@yahoo.com

Received: 3 Apr 2016

Accepted: 14 Oct 2016

Abstract

To assess resistance of different genotypes of safflower to safflower shootfly, 10 genotypes of this plant were evaluated in autumn sowing. The experiments were conducted in a complete blocks design with three replications in Agricultural Research Station Gryzeh-Sanandadj and two growing seasons (2011-2012 and 2012-2013). In this trial some parameters such as rates of infestation and damage, yield, weight of 1000 seeds and percent of oil were measured and compared in different plots. Analysis of variance of percent of infested capitula, number of larvae and pupae, number of damaged seeds, weight of 1000 seeds, percent of oil of seeds, and yield revealed significant difference between genotypes at the 1% probability level. Based on the comparison of mean values, the local varieties named Isfahan and Lesaf had highest and Syrian had lowest percent of infested capitula. Accordingly, local variety of Isfahan had maximum and local genotype of Marand had minimum number of larvae and pupae per capitula. The Lesaf genotype was more susceptible and had highest percent of damaged seed and genotypes of local Isfahan, Marand and Syrian had the lowest number of damaged seeds. Evaluated genotypes were divided into two main groups based on the results. The first group including Syrian, local Marand, Sina, 411 and IL111, with lowest percentage of infested capitula, lowest number of larvae and pupae in the capitula and lowest percent and number of damaged seeds, could be considered as relatively tolerant to the safflower fly. Syrian and local genotype of Marand, were more tolerant among the rest. The second group including Isfahan, Lesaf, S-541, Dinser and coarse-grained Almaneh, with the highest percentage of infested capitula, the highest number of larvae and pupae in the capitula and highest percent of damaged seeds, could be considered as susceptible to the safflower fly. Local cultivar of Isfahan and Lesaf were more sensitive than others.

Keywords: *Acanthiophilus helianthi*, Genotype, Resistance, Safflower.