

## معرفی بخشی از فون کنه‌های میان‌استیگمای (Acari: Mesostigmata) خاک‌زی جنگل‌های ارسباران، شمال استان آذربایجان شرقی

مجتبی محمد دوستارشرف<sup>۱</sup>، داود شیردل<sup>۲\*</sup> و شهرام میرفخرایی<sup>۳</sup>

- ۱- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.
- ۲- بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی. تبریز.
- ۳- استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

\*مسئول مکاتبه: dshirdel@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۵/۳/۱

تاریخ دریافت: ۹۴/۶/۲۱

### چکیده

راسته‌ی میان‌استیگمایان یکی از بزرگترین گروه‌ها در زیررده‌ی کنه‌ها بوده و اعضای آن جزو اجزای مهم اکوسیستم‌های طبیعی و کشاورزی محسوب می‌شوند. طی سال ۱۳۹۲، فون کنه‌های میان‌استیگمای خاک‌زی جنگل‌های ارسباران در منطقه‌ی آینالو واقع در شمال استان آذربایجان شرقی جمع‌آوری و شناسایی گردید. بدین منظور، از خاک و خاکبرگ این مناطق نمونه‌برداری انجام و کنه‌های موجود در آن‌ها با استفاده از قیف برلز استخراج، در مایع نسبیت شفاف و با استفاده از آمیخته‌ی هویر در اسلایدهای میکروسکوپی تثبیت شدند. در مجموع تعداد ۴۰ گونه متعلق به ۳۲ جنس و ۱۸ خانواده از خاک و مواد پوسیده‌ی این منطقه جمع‌آوری و شناسایی گردید که ۲۰ گونه از آن‌ها برای اولین بار از استان آذربایجان شرقی گزارش می‌شوند و علاوه بر آن کلیدی برای شناسایی کنه‌های میان‌استیگمای خاک‌زی جمع‌آوری شده در این مطالعه ارائه شده است. از بین خانواده‌های جمع‌آوری شده، خانواده‌ی Veigaiidae دارای بیشترین فراوانی نسبی (۱۹/۰۱) درصد و خانواده‌های Laelapidae و Zerconidae به ترتیب با فراوانی‌های ۱۵/۲۱ و ۱۳/۱۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. اسامی گونه‌های شناسایی شده به تفکیک خانواده به شرح زیر می‌باشد. گونه‌های جدید برای فون کنه‌های استان آذربایجان شرقی با یک ستاره (\*) مشخص شده‌اند:

**Ameroseiidae:** *Ameroseius furcatus* (Karg, 1971)\*, *Epicriopsis cf. palustris* (Karg, 1971); **Ascidae:** *Zerconopsis michaeli* (Evans & Hyatt, 1960)\*, *Arctoseius semiscissus* (Berlese, 1892)\*, *Asca aphidiooides* (Linnaeus, 1758)\*, *A. bicornis* (Canestrini & Fanzago, 1876)\*, *Antennoseius bacatus* (Athias-Henriot, 1961)\*; **Blattisocidae:** *Lasioseius* sp.; **Celaenopsidae:** *Celaenopsis badius* (C.L. Koch, 1839)\*; **Digamasellidae:** *Dendrolaelaps* sp.; **Epicriidae:** *Epicrius cf. bulgaricus* (Balogh, 1958); **Laelapidae:** *Laelaspis astronomicus* (Koch, 1839), *Cosmolaelaps luteiensis* (Shcherbak, 1971), *C. vacua* (Michael, 1891), *Gamasodes aculeifer* (Canestrini, 1884), *G. iranicus* (Kavianpour & Nemati, 2013), *Pseudoparasitus dentatus* (Halbert, 1920)\*, *P. missouriensis* (Ewing, 1909)\*; **Macrochelidae:** *Macrocheles glaber* (Müller, 1860)\*, *Macrolaspis recki* (Bregetova & Koroleva, 1960); **Macrodinychidae:** *Macrodinychus bregetovae* (Hirschmann, 1975)\*; **Melicharidae:** *Proctolaelaps pygmaeus* (Müller, 1860)\*; **Pachylaelapidae:** *Olopachys caucasicus* (Koroleva, 1976)\*, *Onchodellus karawajewi* (Berlese, 1920)\*; **Parasitidae:** *Gamasodes spiniger* (Trägårdh, 1910)\*, *Parasitus copridis* (Costa, 1963)\*; **Phytoseiidae:** *Amblyseius azerbaijanicus* (Abbasova, 1970), *A. nemorivagus* (Athias-Henriot, 1961), *A. sp.*, *Typhlodromus bakeri* (Garman, 1948); **Trachytidae:** *Trachytes cf. aegrota* (C.L. Koch, 1841)\*; **Trematuridae:** *Trichouropoda elegans*

(Kramer, 1882)\*, *T.ovalis* (Koch, 1839)\*, *Nenteria stylifera* (Berlese, 1904)\*; **Uropodidae:** *Discourella modesta* (Leonardi, 1899), *Uropoda fumicola* (Schweizer, 1961); **Veigaiidae** *Veigaiia nemorensis* (Koch, 1836), *V. planicola* (Berlese, 1882); **Zerconidae:** *Prozercon norae* (Ujvari, 2011), *Zercon* sp.

واژه‌های کلیدی: آینالو، ایران، فراوانی نسبی، بررسی فونستیک.

#### مقدمه

تعداد کمی از آن‌ها از قارچ، گرده و شهد تغذیه می‌کنند. کنه‌های این راسته ممکن است در خاک، زباله، چوب پوسیده، کود گیاهی، کود جانوری، لاشه، آشیانه‌ها، خانه‌های کاهگلی، قارچ‌ها، حیوانات و روی گیاهان زندگی و یافت شوند (لیندکوئیست و همکاران ۲۰۰۹). تا کنون به غیر از مطالعات تبریزی و همکاران (۱۳۹۲)، قبلی وند و همکاران (۲۰۱۲) و کاظمی و دوستدار شرف (۲۰۱۵) مطالعه‌ی جامعی در مورد شناسایی فون کنه‌های خاک-زی جنگل‌های ارسباران انجام نشده است. مطالعات زیادی برای شناسایی کنه‌های خاکزی میان استیگما در سایر مناطق ایران انجام شده که از آن جمله می‌توان به مطالعات مثنوی‌پور و همکاران (۱۳۹۰)، ارجمندی و کاظمی (۱۳۹۲)، بیگدلی و همکاران (۱۳۹۳)، زارعی و کاظمی (۱۳۹۳)، کاظمی و کوتچان (۲۰۱۴)، کاظمی و همکاران (۲۰۱۴)، کاظمی (۲۰۱۵) و شمسی و همکاران (۲۰۱۶) اشاره کرد. کاظمی و رجایی در سال ۲۰۱۳ چکلیستی برای میان استیگما میان ایران ارائه نمودند. با توجه به وسعت کشور ایران و برخورداری از اقلیم‌های متنوع و زیستگاه‌های گوناگون کنه‌ها، به یقین این بررسی‌ها بسیار اندک است، لذا با توجه به اهمیت زیستگاه‌های طبیعی (جنگل) و به منظور فراهم آوردن اطلاعات بنیادی و بستر سازی برای مطالعات کاربردی و وسیع‌تر، تحقیق حاضر برای شناسایی فون کنه‌های میان استیگما خاکزی در این منطقه انجام گرفت. ناحیه‌ی آینالو در قسمت شمالی جنگل‌های ارسباران واقع شده، از توابع بخش خدآفرین شهرستان کلیبر بوده و حدود ۴۵ کیلومتر با کلیبر فاصله دارد. روستاهایی

خاک در زمره‌ی مهم‌ترین و متنوع‌ترین زیستگاه‌های دارای غنای گونه‌ای در زمین و حاوی ترکیبی از متنوع-ترین موجودات زنده است (ژرمیدا و همکاران ۱۹۹۸ و هیل و روزنزویگ ۲۰۰۵). شواهد زیادی وجود دارد که استفاده از خاک‌ها و ایجاد هر نوع تغییر در آن‌ها منجر به تغییر در اکوسیستم‌های طبیعی می‌گردد. جنگل‌ها به عنوان یک اکوسیستم در برگیرنده‌ی گونه‌های متعدد جانوری و گیاهی (مجموعه‌ای از تنوع زیستی) جایگاه مهمی در تداوم حیات و رفاه بشر دارند. جنگل‌های حفاظت شده‌ی ارسباران به دلیل در برداشتن زیست‌بوم‌های گوناگون، ارزش زیست‌شناسختی بسیار بالا و گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر به‌فرد، به عنوان نخیره‌گاه زیست‌کرده شناخته می‌شوند. وجود ۱۰۷۲ گونه‌ی علفی و ۹۷ گونه‌ی چوبی در این منطقه، نشان‌گر تنوع زیستی و گیاهی بسیار زیاد آن بوده و مهم‌ترین مشخصه‌ی این منطقه محسوب می‌شود. این منطقه از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است (علی‌نژاد ۱۳۹۲). میان استیگما میان<sup>۱</sup> یکی از راسته‌های بسیار متنوع کنه‌ها هستند و حدود ۱۲۰۰ گونه از آن‌ها شناسایی شده است. این راسته گروه بزرگ و همه‌جازی از کنه‌های پارازیتی فرم است که به‌طور وسیعی دارای تنوع در شیوه‌های زندگی و زیستگاه هستند. بیشتر گونه‌ها شکارگرهایی با زندگی آزاد هستند، در صورتی که دسته‌ی دیگری از آن‌ها مرتبط با پستانداران، پرندگان، خزندگان و یا بندپایان می‌باشند.

<sup>1</sup>Mesostigmata

ثبت گردید که در جدول ۱ و شکل ۱ ارایه شده‌اند. مراحل نابالغ فقط در مورد گونه‌هایی که طی این تحقیق در این مراحل یافت شدند، در تعیین درصد فراوانی گونه‌ها در نظر گرفته شدند. نمونه‌های جمع‌آوری شده در این مطالعه به صورت اسلامید میکروسکوپی در کلکسیون آزمایشگاه کنه‌شناسی گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نگه‌داری می‌شوند.

همچون کلاله، وايقان، گرمناب و آينالو در اين ناحيه واقع شده‌اند. ارتفاع اين منطقه از سطح دريا در حدود ۱۵۰۰ متر است. ويژگي مشخص جنگلهای ارسباران از جمله محدوده‌ی آينالو، تعداد روزهای مهآلود است که به علت همين شرایط خاص و علیرغم سطح نسبتا پايان بارندگی (۴۵۰-۶۰۰ ميلى متر)، امكان شكلگيری جنگلهای انبوه از طريق بارش مخفی (مهبارش) به وجود آمده است. درختان غالب اين منطقه به ترتيب عبارتند از: ممرز، زغال‌اخته، بلوط، شفت و افرا (افتخاري).<sup>۱</sup>

### مواد و روش‌ها

به منظور بررسی فون کنه‌های خاکزی راسته‌ی میان آستیگمایان جنگلهای ارسباران در منطقه‌ی آينالو، نمونه‌برداری‌هایی از بقایای گیاهی پوسیده و خاک پای درختان جنگلی در نقاط مختلف این منطقه طی سال ۱۳۹۲ به عمل آمد. پس از جمع‌آوری نمونه‌های خاک، کنه‌های موجود در این نمونه‌ها با استفاده از قیف برلز<sup>۲</sup> جداسازی و در محلول اودمان<sup>۳</sup> نگه‌داری شدند. جهت شفافسازی کنه‌ها از محلول نسبیت<sup>۴</sup> استفاده شد و پس از شفافیت مطلوب، از کنه‌ها در آمیخته‌ی هوير<sup>۵</sup> اسلامید میکروسکوپی دائمی تهیه گردید (والتر و کرانتز ۲۰۰۹). نمونه‌ها با استفاده از کلیدهای معتبر و موجود مورد شناسایی قرار گرفته و درصد فراوانی گونه‌های شناسایی شده تعیین گردید. مختصات جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریای محلهای نمونه‌برداری با استفاده از سامانه‌ی موقعیت‌یابی جهانی (جي‌پي‌اس)<sup>۶</sup> و ميانگين‌های دما و رطوبت نسبی روزانه اين محلها با استفاده از اطلاعات ايستگاه هواشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان واقع در منطقه‌ی آينالو

<sup>1</sup>Berlese's funnel

<sup>2</sup>Oudemans's fluid


<sup>3</sup>Nesbitt's fluid

<sup>4</sup>Hoyer's medium

<sup>5</sup>Global Positioning System (GPS)

جدول ۱- مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی مناطق نمونهبرداری طی این مطالعه.

تاریخ	کد منطقه	میانگین دما (درجه سلسیوس)	میانگین رطوبت روزانه (درصد)	طول جغرافیایی (شرقی)	عرض جغرافیایی ( شمالی)	ارتفاع از سطح دریا (متر)
۱۳۹۲/۰۴/۰۶	A	۲۰/۹	۵۶/۸	۴۶° ۴۵' ۱۸"	۳۸° ۵۶' ۱۵"	۱۳۸۰
۱۳۹۲/۰۴/۰۸	B	۲۳/۱	۴۲/۳	۴۶° ۴۵' ۴۱"	۳۸° ۵۶' ۲۲"	۱۱۹۰
۱۳۹۲/۰۴/۰۹	C	۲۴/۳	۴۴/۹	۴۶° ۴۷' ۳۱"	۳۸° ۵۴' ۴۵"	۱۴۵۰
۱۳۹۲/۰۵/۰۸	D	۱۵/۹	۵۵/۴	۴۶° ۴۵' ۲۸"	۳۸° ۵۶' ۰۴"	۱۵۰۰
۱۳۹۲/۰۵/۱۳	E	۲۶/۹	۴۰/۳	۴۶° ۴۷' ۵۵"	۳۸° ۵۴' ۴۰	۱۲۵۰
۱۳۹۲/۰۵/۱۵	F	۲۰/۶	۵۴/۲	۴۶° ۴۷' ۳۸"	۳۸° ۵۳' ۰۳"	۱۷۰۰
۱۳۹۲/۰۶/۱۶	G	۱۲/۳	۶۶/۸	۴۶° ۴۶' ۳۲"	۳۸° ۵۵' ۵۴"	۱۲۸۰
۱۳۹۲/۰۶/۱۷	H	۱۴/۹	۶۲/۲	۴۶° ۴۵' ۲۶"	۳۸° ۵۶' ۲۴"	۱۱۵۰
۱۳۹۲/۰۶/۲۰	I	۱۶/۸	۶۰/۴	۴۶° ۴۶' ۳۴"	۳۸° ۵۵' ۴۳"	۱۳۵۰
۱۳۹۲/۰۶/۲۴	J	۱۶/۲	۶۱/۹	۴۶° ۴۵' ۳۱"	۳۸° ۵۶' ۲۳"	۱۲۰۰



شکل ۱- مناطق نمونهبرداری در جنگل های ارسپاران.

۴ (الف)- کلیسرها بدون گرهی اسکلروتینی شده	۴
۵ .....	۵
۴ (ب)- کلیسرها دارای گرهی اسکلروتینی شدهی درونی	۴
۶ .....	۶
۵ (الف)- بدن تخم مرغی شکل؛ سطح پشتی ایدیوزوما دارای صفحات پیژیدیومی و حاشیه‌ای؛ صفحه‌ی جنسی متلثی شکل و در قسمت جلو فاقد زبانه‌ی نوکتیز و نسبتا <i>Discourella modesta</i> ..... Uropodidae	۵
۵ (ب)- بدن گرد؛ سطح پشتی ایدیوزوما فاقد صفحات پیژیدیومی و حاشیه‌ای؛ صفحه‌ی جنسی تخم مرغی شکل و در قسمت جلو دارای زبانه‌ی نوکتیز و نسبتا طویل <i>Uropoda fumicola</i> ..... Uropodidae	۵
۶ (الف)- دندانه‌های داخلی هیپوستوم دندانه‌دار؛ انگشت متحرک کلیسر دارای یک دندانه ..... <i>Macrodinychidae</i>	۶
<i>Macrodinychus bregetovae</i> .....	
۶ (ب)- دندانه‌های داخلی هیپوستوم صاف؛ انگشت متحرک کلیسر اغلب دارای بیش از یک دندانه	۶
۷ .....	۷
۷ (الف)- کورنیکول‌ها در انتهای دارای تنها یک دندانه و در HASHIYEHی داخلی دارای پارالاسینیا؛ انگشت متحرک کلیسر دارای یک یا دو دندانه و انگشت ثابت در قسمت نیمه انتهایی دارای برجستگی حسی؛ تکتوم دارای ساقه‌ی میله‌مانند و در انتهای چماقی شکل؛ صفحه‌ی جنسی ماده‌ها <i>Trematuridae</i> ..... <i>Nenteria stylifera</i> .....	۷
۷ (ب)- کورنیکول‌ها انگشتی شکل و در انتهای دارای یک تا پنج دندانه؛ هر دو انگشت کلیسر دارای سه تا پنج دندانه؛ تکتوم خنجری شکل و در طرفین اره‌مانند؛ صفحه‌ی جنسی ماده‌ها در قسمت جلو فاقد زائدی نوکتیز	۷
۸ ..... <i>Trichouropoda Berlese</i> ..... Trematuridae	۸
۸ (الف)- موهای سطح پشتی و حاشیه‌ای بلند و کنگره‌ای؛ صفحه‌ی جنسی بزرگ، مخروطی شکل و فاقد	۸

## نتایج و بحث

در مجموع، تعداد ۴۰ گونه متعلق به ۳۲ جنس از ۱۸ خانواده‌ی راسته‌ی میان‌آستیگمایان (Acari: Mesostigmata) از نمونه‌های خاک مناطق مختلف تحت بررسی جمع‌آوری و شناسایی شدند. اسامی گونه‌های شناسایی شده، محل جمع‌آوری و زیستگاه آن‌ها در جدول ۲ ارایه شده است.

## کلید شناسایی کنه‌های میان‌آستیگمای خاکزی جمع-

آوری شده در این مطالعه

۱ (الف)- سوراخ زادآوری با سه صفحه (دو صفحه‌ی جنسی کناری و یک صفحه جنسی میانی، هر سه صفحه جوش خورده به صفحه‌ی شکمی)؛ دارای یک صفحه‌ی پس‌مخرجی ..... <i>Celaenopsidae</i>	۱
<i>Celaenopsis badius</i> .....	
۱ (ب)- سوراخ زادآوری با یک صفحه (صفحه‌ی جنسی) و دارای صفر تا چهار جفت مو روی این صفحه؛ فاقد صفحه‌ی پس‌مخرجی ..... ۲	۱
۲ (الف)- صفحه‌ی جنسی در ماده‌ها بیضی شکل، نیمه‌متلثی یا زبان‌مانند و بدون مو؛ لوله‌ی تنفسی سینوسی شکل و گاهی دارای زایده‌های خارمانند؛ موهای هیپوستومی واقع در یک راستا ..... ۳	۲

۲ (ب)- صفحه‌ی جنسی در ماده‌ها فلاسکشکل، نیمه‌متلثی یا گوهای و دارای یک تا چهار جفت مو؛ لوله‌ی تنفسی خطی و گاهی قسمت عقب یا جلوی آن با حالت برگشتگی؛ موهای هیپوستومی در آرایش متلثی شکل ..... ۹	۲
۳ (الف)- قاعده‌ی تریتواسترنوم دو برابر عریض‌تر از طول آن؛ فاقد حفره‌ی پایی ..... <i>Trachytidae</i>	۳

۳ ..... <i>Trachytes cf aegrota</i> .....	۳
۴ (ب)- قاعده‌ی تریتواسترنوم عریض‌تر از طول آن نیست؛ دارای حفره‌ی پایی ..... ۴	۴

پس‌سینه‌ای احاطه شده؛ پاهای دوم در نرها دارای آپوفیز ۱۳.....	
۱۲ (ب)- موی ST4 روی صفحه‌ی کوچک پس‌سینه‌ای یا کوتیکول نرم؛ صفحه‌ی جنسی مانند بالا نیست؛ پاهای دوم در نرها بدون آپوفیز..... ۱۴.....	
۱۳ (الف)- موی ۲s بیرون از صفحه‌ی پودونوتال؛ بند ران در پای دوم دارای یک موی ضخیم و تغییر شکل یافته؛ تکتوم مخروطی شکل شاخه‌ی میانی نوکتیز و Parasitidae ..... <i>Gamasodes spiniger</i> .....	
۱۳ (ب)- موی ۲s روی صفحه‌ی پودونوتال؛ بند ران در پای دوم فاقد موی ضخیم و تغییر شکل یافته؛ تکتوم مخروطی شکل با شاخه‌ی میانی پهن و خمیده ..... <i>Parasitus copridis</i> ..... ۱۴ (الف)- دندانه‌های داخلی هیپوستوم با حالت فیبری و دو تکه (حالت سبیل‌مانند)؛ دارای منافذ غده‌ای در عقب پای چهارم؛ زانوی پای چهارم دارای ۱۰ مو..... ۱۵.....	
۱۴ (ب)- دندانه‌های داخلی هیپوستوم با حالت معمولی؛ بدون منافذ غده‌ای در عقب پای چهارم؛ زانوی پای چهارم دارای نه مو و به ندرت ۱۰ مو..... ۱۶.....	
۱۵ (الف)- انگشت ثابت کلیسر با ۱۵-۲۱ دندانه‌ی کوچک و گرد که ما بین دو دندانه‌ی بزرگ قرار گرفته و انگشت متحرک کلیسر دارای سه دندانه؛ صفحه‌ی شکمی در انتهای <i>Veigaia planicola</i> ..... گرد..... ۱۵ (ب)- انگشت ثابت کلیسر با یک برآمدگی ما بین دو دندانه‌ی بزرگ قرار گرفته و انگشت متحرک کلیسر با یک دندانه‌ی نیمه‌انتهایی؛ صفحه‌ی شکمی در انتهای بریده <i>Veigaia nemorensis</i> ..... ۱۶ (الف)- صفحه‌ی سینه‌ای در افراد ماده با صفحه‌ی پس‌سینه‌ای ادغام شده و دارای چهار جفت موی سینه‌ای؛	

Trematuridae .... <i>Trichouropoda elegans</i> .....	
۸ (ب)- موهای سطح پشتی و حاشیه‌ای کوتاه و صاف؛ صفحه‌ی جنسی کوچک، گرد و دارای حفرات بیضی شکل روی سطح جانبی؛ لوله‌ی تنفسی M شکل <i>Trichouropoda ovalis</i> ..... Trematuridae .....	
۹ (الف)- سوراخ تنفسی برجسته، روی یک برآمدگی و بدون لوله‌ی تنفسی؛ زبانه‌های تریتواسترنوم کوتاه‌تر از طول قاعده‌ی آن؛ پای اول دراز و پنجه‌ی آن دارای موهای بلند چماقی شکل ..... <i>Epiicridae</i> ..... <i>Epicrius cf. bulgaricus</i> .....	
۹ (ب)- سوراخ تنفسی معمولی و دارای لوله‌ی تنفسی؛ زبانه‌های تریتواسترنوم بلندتر از طول قاعده‌ی آن؛ پای اول کوتاه و پنجه‌ی آن بدون موهای بلند چماقی شکل ۱۰.....	
۱۰ (الف)- زانوی پای سوم و چهارم هر کدام دارای ۱۰ مو؛ نرها بدون اسپرماتوداکتیل؛ لوله‌ی تنفسی اغلب کوتاه ۱۱.....	
۱۰ (ب)- زانوی پای سوم و چهارم هر کدام دارای ۹ یا شمار کمتری مو؛ نرها دارای اسپرماتوداکتیل؛ لوله‌ی تنفسی اغلب توسعه‌یافته ..... ۱۲.....	
۱۱ (الف)- موهای سری R صاف و شاخ مانند؛ طول موی حاشیه‌ای SI تقریباً دو برابر طول موهای سری R؛ طول هر موی سری J برابر فاصله‌ی آن با موی بعدی <i>Prozercon norae</i> ..... Zerconidae .....	
۱۱ (ب)- موهای سری R پروش؛ طول موی حاشیه‌ای SI تقریباً برابر طول موهای سری R؛ طول هر موی سری J کوتاه‌تر از فاصله‌ی آن با موی بعدی <i>Zercon sp.</i> ..... Zerconidae .....	
۱۲ (الف)- موی ST4 روی صفحه‌ی بزرگ سینه‌ای- جنسی یا پس‌سینه‌ای؛ صفحه‌ی جنسی مثلثی و شکل V معکوس که در بخش جلو با یک جفت صفحه‌ی	

Pachylaelapidae .....	موی بلند
<i>Olopachys caucasicus</i> .....	
(ب)- صفحه‌ی جنسی با صفحه‌ی شکمی ادغام شده و صفحه‌ی مخرجی آزاد؛ موی Z5 هماندازه با سایر موها؛ صفحه‌ی سینه‌ای با صفحه‌ی پس‌سینه‌ای ترکیب شده و دارای چهار جفت موی Pachylaelapidae	۲۰
<i>Onchodellus karawaiewi</i> .....	
(الف)- سطح پشتی ایدیوزوما بدون موها پهلوی سری R و موی J5؛ کورنیکول‌ها در انتهای دوشاخه ....	۲۱
(ب)- سطح پشتی ایدیوزوما دارای موها پهلوی سری R و موی J5؛ کورنیکول‌ها به طور معمول یکپارچه.....	۲۲
(الف)- سطح پشتی ایدیوزوما دارای فرورفتگی‌های حفره‌مانند؛ موی Z5 به طور مشخص بلندتر از سایر موها؛ پای اول تقریباً هماندازه با سایر پاهای Ameroseius furcatus .....	۲۲
(ب)- سطح پشتی ایدیوزوما دارای تزیینات ستاره‌ای شکل؛ موی Z5 تقریباً هماندازه با سایر موها؛ پای اول به طور مشخص بلندتر از سایر پاهای <i>Epicriopsis palustris</i> .....	۲۲
(الف)- صفحه‌ی پشتی در افراد کامل با کمتر از ۲۰ جفت مو و بدون موها J1 و J4؛ سطح پشتی ایدیوزوما دارای یک جفت موی پهلوی سری R روی کوتیکول نرم.....	۲۰
(ب)- صفحه‌ی پشتی در افراد کامل با بیشتر از ۲۰ جفت مو و دارای موها J1 و J3 و J4؛ سطح پشتی ایدیوزوما دارای بیش از یک جفت موی پهلوی سری R روی کوتیکول نرم.....	۲۳
(الف)- پای چهارم دارای یک ابرموی نوک گرد روی قاعده‌ی پنجه؛ موها Z4 و Z5 دندانه‌دار و کوتاه؛ صفحه‌ی شکمی مخرجی دارای چهار جفت موی	۲۴

دارای چهار عدد گره اسکلروتینی (اسکلرونودولی) در قسمت میانی سطح پشتی ایدیوزوما	.....
<i>Dendrolaelaps</i> sp. .....	Digamasellidae
(ب)- صفحه‌ی سینه‌ای در افراد ماده از صفحه‌ی پس‌سینه‌ای جدا و دارای دو یا سه جفت موی سینه‌ای؛ بدون گره اسکلروتینی (اسکلرونودولی) در قسمت میانی سطح پشتی ایدیوزوما .....	۱۶
(الف)- صفحه‌ی جنسی در افراد ماده دارای اسکلریت ضمیمه‌ی کناری؛ اندام برس‌مانند در قاعده‌ی انگشت متحرک کلیسیر به صورت یک موی پروش؛ لوله‌ی تنفسی در کنار سوراخ تنفسی به صورت حلقه‌وار دور زده و در بخش عقب به آن رسیده.....	۱۷
(ب)- صفحه‌ی جنسی در افراد ماده فاقد اسکلریت ضمیمه‌ی کناری؛ اندام برس‌مانند در صورت وجود در قاعده‌ی انگشت متحرک کلیسیر با حالت ریش‌ریش؛ لوله‌ی تنفسی معمولی.....	۱۷
(الف)- صفحه‌ی پشتی مشبك با حاشیه‌ی جانبی صاف؛ موها سطح پشتی سوزنی‌شکل و کوتاه؛ صفحه‌ی شکمی- مخرجی تقریباً پنج‌وجهی .....	۱۸
<i>Macrocheles glaber</i> .....	Macrochelidae
(ب)- صفحه‌ی پشتی در قسمت انتهای مشبك و در قسمت حاشیه‌ی جانبی کمی دندانه‌دار؛ موها سطح پشتی پروش؛ صفحه‌ی شکمی- مخرجی تقریباً گرد	۱۸
<i>Macrolaspis recki</i> .....	Macrochelidae
(الف)- پنجه‌ی پای دوم دارای دو خار انتهایی؛ صفحه‌ی پریترمی- برون‌پایی در عقب پای چهارم با صفحه‌ی پس‌پایی ادغام شده .....	۱۹
(ب)- پنجه‌ی پای دوم بدون خار انتهایی؛ صفحات پریترمی، برون‌پایی و پس‌پایی جدا از هم .....	۲۰
(الف)- صفحات جنسی، شکمی و مخرجی ادغام شده؛ موی Z5 بسیار کوچک؛ صفحه‌ی سینه‌ای با سه جفت	۲۰

کوتیکول نرم؛ به طور معمول انگشت متحرک کلیسر دارای دو دندانه.....	۲۹
(ب)- جفت سوم منفذ سینه‌ای در گوشه‌های کناری صفحه‌ی سینه‌ای نیست؛ موی ST4 اغلب روی صفحه‌ی پس‌سینه‌ای؛ به طور معمول انگشت متحرک کلیسر دارای بیش از دو دندانه .....	۳۳
(الف)- صفحه‌ی پشتی دو قسمتی؛ صفحه‌ی اپیستونوتال دارای یک جفت برجستگی انتهایی جانبی .....	۳۰
(ب)- صفحه‌ی پشتی یک قسمتی؛ صفحه‌ی اپیستونوتال بدون برجستگی انتهایی جانبی .....	۳۱
(الف)- موهای Z4 و S4 نزدیک به هم و هر دو روی برجستگی انتهایی جانبی صفحه‌ی اپیستونوتال؛ موی Z4 به شدت مودار؛ موهای پشتی از قاعده به انتهای مودار <i>Asca bicornis</i> ..... Ascidae	۳۰
(ب)- موهای Z4 و S4 به طور کامل جدا از هم و فقط موی Z4 روی برجستگی انتهایی جانبی صفحه‌ی اپیستونوتال؛ موی Z4 سوزنی‌شکل؛ موهای پشتی ساده <i>Asca aphidiooides</i> ..... Ascidae	۳۰
(الف)- پای اول فاقد ناخن؛ موهای سطح پشتی پر زدار؛ تکتوم سه‌شاخه ..... Ascidae	۳۱
<i>Antennoseius bacatus</i> .....	
(ب)- پای اول دارای ناخن؛ موهای سطح پشتی سوزنی‌شکل؛ تکتوم دو یا سه‌شاخه .....	۳۱
(الف)- صفحه‌ی پشتی با ساختارهای حلقه‌مانند و در قسمت میانی جانبی دارای بریدگی؛ موهای سطح پشتی نسبتا بلند؛ تکتوم دو شاخه ..... Ascidae	۳۲
<i>Arctoseius semiscissus</i> .....	
(ب)- صفحه‌ی پشتی فاقد ساختارهای حلقه‌مانند و در قسمت میانی جانبی بدون بریدگی؛ موهای سطح	۳۲

Phytoseiidae .....	پیش‌مخرجی
<i>Typhlodromus bakeri</i> .....	
(ب)- پای چهارم دارای سه ابرمو روی بندهای زانو، ساق و قاعده‌ی پنجه؛ موهای Z4 و Z5 صاف، دراز و شلاقی؛ صفحه‌ی شکمی مخرجی دارای سه جفت موی .....	۲۴
پیش‌مخرجی .....	۲۵
(الف)- کالکس اسپر ماتکا دراز و لوله‌ای‌شکل؛ انگشت ثبت کلیسر دارای ۱۵ دندانه ریز و یک دندانه بزرگ و دندانه‌ی پیلوس، انگشت متحرک کلیسر دارای سه Dndanahی بزرگ .....	۲۵
<i>Phytoseiidae</i> .....	
<i>Amblyseius azerbaijanicus</i> .....	
(ب)- کالکس اسپر ماتکا کوتاه؛ انگشت ثابت کلیسر دارای کمتر از ۱۵ دندانه، انگشت متحرک کلیسر دارای سه دندانه کوچک .....	۲۵
(الف)- کالکس اسپر ماتکا کاسه‌ای‌شکل؛ انگشت ثابت کلیسر با شش دندانه و دندانه‌ی پیلوس کوچک؛ انگشت متحرک کلیسر با سه دندانه، که دندانه‌ی سوم کوچک‌تر <i>Phytoseiidae</i> .....	۲۶
<i>Amblyseius nemorivagus</i> .....	
(ب)- کالکس اسپر ماتکا زنگوله‌ای‌شکل؛ انگشت ثابت کلیسر با چهار دندانه و دندانه‌ی پیلوس بزرگ، انگشت متحرک کلیسر با سه دندانه‌ی هماندازه .....	۲۶
<i>Amblyseius sp.</i> .....	<i>Phytoseiidae</i>
(الف)- ناحیه‌ی عقبی صفحه‌ی جنسی در افراد ماده بریده شده یا با حالت محدب؛ دارای صفحه‌ی شکمی- مخرجی یا مخرجی (صفحه‌ی مخرجی بیضی‌شکل) .....	۲۷
(ب)- ناحیه‌ی عقبی صفحه‌ی جنسی در افراد ماده گرد؛ دارای صفحه‌ی شکمی-مخرجی یا مخرجی (صفحه‌ی مخرجی مثلثی شکل) .....	۲۷
(الف)- جفت سوم منفذ سینه‌ای واقع در گوشه‌های کناری صفحه‌ی سینه‌ای؛ موی ST4 به طور معمول روی	۳۴

..... شکل؛ تکتوم کمانی شکل با دندانه‌های بلند .....  
*Gaeolaelaps aculeifer* ..... Laelapidae

(ب)- صفحه‌ی پشتی با ۳۶ جفت مو؛ پاهای دوم با  
موهای ساده؛ صفحه‌ی جنسی دارای طرح V شکل؛  
تکتوم کمانی شکل با دندانه‌های ریز ..... Laelapidae  
*Gaeolaelaps iranicus* .....

(الف)- صفحه‌ی جنسی توسعه‌یافته با سه جفت مو؛  
تکتوم مثلثی شکل؛ انگشت متحرک کلیسر با دو دندانه  
*Laelaspis astronomica* ..... Laelapidae

(ب)- صفحه‌ی جنسی توسعه‌یافته با چهار جفت مو؛  
تکتوم قوسی شکل؛ انگشت متحرک کلیسر با یک دندانه  
..... ۳۹

(الف)- صفحه‌های پسپایی کوچک، میله‌ای شکل و  
چسبیده به صفحه‌های بروون‌پایی در قسمت عقب پای  
چهارم؛ حاشیه‌ی عقبی صفحه‌ی سینه‌ای صاف .....  
*Pseudoparasitus missouriensis* ..... Laelapidae

(ب)- صفحه‌های پسپایی بزرگ، مثلثی شکل و آزاد؛  
 HASHIYEH‌ی عقبی صفحه‌ی سینه‌ای گرد ..... Laelapidae  
*Pseudoparasitus dentatus* .....

Ascidae .....	پشتی نسبتاً کوتاه؛ تکتوم سه شاخه .....
Zerconopsis michaeli .....	
۳۳ (الف)- سطح پشتی ایدیوزوما با دو جفت موی پهلوی سری <i>R</i> روی کوتیکول نرم جانبی؛ دندانه‌ی پیلوس در انگشت ثابت کلیسر تغییرشکل یافته و شفاف، انگشت متحرک در سطح میانی شکمی دارای زائدی نوکتیز موکرو؛ صفحه‌ی جنسی افراد ماده در ناحیه‌ی عقبی گرد .....	<i>Melicharidae</i> .....
<i>Proctolaelaps pygmaeus</i> .....	
۳۳ (ب)- سطح پشتی ایدیوزوما با بیش از دو جفت موی پهلوی سری <i>R</i> روی کوتیکول نرم جانبی؛ دندانه‌ی پیلوس در انگشت ثابت کلیسر مویی شکل، انگشت متحرک در سطح میانی شکمی فاقد زائدی نوکتیز موکرو؛ صفحه‌ی جنسی افراد ماده در ناحیه‌ی عقبی حالت بریده	<i>Lasioseus</i> sp. .... <i>Blattisocidae</i> .....
۳۴ (الف)- تکتوم دندانه‌دار؛ هر ردیف از شیار سینه‌ی دوم با بیش از شش دندانه ..... ۲۵	
۳۴ (ب)- تکتوم صاف؛ هر ردیف از شیار سینه‌ی دوم دارای دو تا شش دندانه ..... ۲۸	
۳۵ (الف)- موهای صفحه‌ی پشتی چاقویی یا برگی شکل ..... ۳۶	
۳۵ (ب)- موهای صفحه‌ی پشتی عادی و مویی شکل ..... ۳۷	
۳۶ (الف)- انگشت ثابت کلیسر با پنج دندانه؛ تکتوم با دندانه‌های کوتاه .....	<i>Laelapidae</i> .....
<i>Cosmolaelaps vacua</i> .....	
۳۶ (ب)- انگشت ثابت کلیسر با سه دندانه؛ تکتوم با دندانه‌های بلند .....	<i>Laelapidae</i> .....
<i>Cosmolaelaps lutegiensis</i> .....	
۳۷ (الف)- صفحه‌ی پشتی با ۳۹ جفت مو؛ پاهای دوم با موهای خارمانند و قطرور؛ صفحه‌ی جنسی فاقد طرح V	

### محمددوستار شرف و همکاران

جدول ۲ - فهرست، درصد فراوانی، زیستگاه و مناطق جمع آوری گونه‌های میان‌استیگمای جمع آوری شده در این مطالعه.

کد نمونه‌برداری	زیستگاه	درصد فراوانی	گونه	خانواده
J.I	تنه‌ی پوسیده‌ی درخت و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۰/۳۶	<i>Ameroseius furcatus</i> (Karg, 1971)*	<b>Ameroseiidae</b>
E	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۰/۱۸	<i>Epicriopsis cf. palustris</i> (Karg, 1971)*	
J.I	تنه‌ی پوسیده‌ی درخت و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۱/۴۴	<i>Zerconopsis michaeli</i> (Evans & Hyatt, 1960)*	<b>Ascidae</b>
A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۰/۱۸	<i>Arctoseius semiscissus</i> (Berlese, 1892)*	
D.A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۰/۹۰	<i>Asca aphidoides</i> (Linnaeus, 1758)*	
H	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت کاج	۱/۰۸	<i>Asca bicornis</i> (Canestrini & Fanzago, 1876)*	
G.I	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز و تنه‌ی پوسیده‌ی درخت	۰/۳۶	<i>Antennoseius bacatus</i> (Athias-Henriot, 1961)*	
G.E.B.A	خاک مراعع اطراف جنگل و خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۴/۱۶	<i>Lasioseius</i> sp. 1	<b>Blattisocidae</b>
F.I	خاکبرگ پای درخت بلوط و تنه‌ی پوسیده‌ی درخت	۰/۳۶	<i>Celaenopsis badius</i> (C.L. Koch, 1839)*	<b>Celaenopsidae</b>
G.E.D.B.A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز و خاک مراعع اطراف جنگل	۲/۴۴	<i>Dendrolaelaps</i> sp.	<b>Digamasellidae</b>

E .A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۰/۳۶	<i>Epicrius cf. bulgaricus</i> (Balogh, 1958)*	<b>Epicriidae</b>
J .H .B .A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز، خاک مراتع اطراف جنگل، خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت کاج و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۲/۵۳	<i>Laelaspis astronomicus</i> (Koch, 1839)	<b>Laelapidae</b>
J .E	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۱/۴۴	<i>Cosmolaelaps vacua</i> (Michael, 1891)	
G .E	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۰/۵۴	<i>Pseudoparasitus dentatus</i> (Halbert, 1920)*	
E .D .C .A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۲/۱۷	<i>Cosmolaelaps lutegiensis</i> (Shcherbak, 1971)	
J .H .B .A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز، خاک مراتع اطراف جنگل، خاکبرگ پای درخت بلوط و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۴/۸۹	<i>Gaeolaelaps aculeifer</i> (Canestrini, 1884)	
I .G .D .A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز و تنہی پوسیده‌ی درخت	۰.۵۴	<i>Gaeolaelaps iranicus</i> (Kavianpour & Nemati, 2013)	
J .G .E .A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۱/۰۸	<i>Pseudoparasitus missouriensis</i> (Ewing, 1909) *	
B .E	خاک مراتع اطراف جنگل و خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۱/۴۴	<i>Macrocheles glaber</i> (Müller, 1860)*	<b>Macrochelidae</b>
B	خاک مراتع اطراف جنگل مخلوط با کود دامی	۱/۰۸	<i>Macrolaspis recki</i> (Bregetova & Koroleva, 1960)	
G .A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز و داخل تخم مورچه	۲/۱۷	<i>Macrodinychus bregetovaae</i> (Hirschmann, 1975)*	<b>Macrodinychidae</b>

D	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۰/۳۶	<i>Proctolaelaps pygmaeus</i> (Müller, 1860)*	Melicharidae
I.G.E.D.C.A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز و تنہی پوسیده ی درخت	۴/۱۶	<i>Olopachys caucasicus</i> (Koroleva, 1976)*	Pachylaelapidae
J.I.B	خاک مراتع اطراف جنگل، تنہی پوسیده درخت و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۱/۹۹	<i>Onchodellus karawaiewi</i> (Berlese, 1920)*	
J.I	تنہی پوسیده درخت و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۰/۳۶ دئوتونمف	<i>Gamasodes spiniger</i> (Trägårdh, 1910)*	Parasitidae
D	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۰/۷۲ دئوتونمف	<i>Parasitus copridis</i> (Costa, 1963)*	
J.G.E.D.A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۲/۷۱	<i>Amblyseius azerbaijanicus</i> (Abbasova, 1970)	Phytoseiidae
J.I.G.D.C.A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز، تنہی پوسیده درخت و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۱/۸۱	<i>Amblyseius nemorivagus</i> (Athias-Henriot, 1961)	
F.C.A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز و خاکبرگ پای درخت بلوط	۴/۵۲	<i>Amblyseius</i> sp.	
E.A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز	۲/۱۷	<i>Typhlodromus bakeri</i> (Garman, 1948)	
J.G.E.D.B.A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز، خاک مراتع اطراف جنگل و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۶/۱۵	<i>Trachytes cf. aegrota</i> (C.L. Koch, 1841)*	Trachytidae

J.F	خاکبرگ پای درخت بلوط و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۰/۹۰	<i>Trichouropoda elegans</i> (Kramer, 1882)*	Trematuridae
J.I.E.C	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز، تنہی پوسیده‌ی درخت و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۱/۹۹	<i>Trichouropoda ovalis</i> (Koch, 1839)*	
J.F	خاکبرگ پای درخت بلوط و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۰/۵۴	<i>Nenteria stylifera</i> (Berlese, 1904)*	
J.I.G.F.E.D.B., A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز، خاک مراعع اطراف جنگل، خاکبرگ پای درخت بلوط، تنہی پوسیده‌ی درخت و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۵/۲۵	<i>Discourella modesta</i> (Leonardi, 1899)	Uropodidae
B	خاک مراعع اطراف جنگل	۱/۲۶	<i>Uropoda fumicola</i> (Schweizer, 1961)	
J.I.F.E.D.C.B., A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز، خاک مراعع اطراف جنگل، خاکبرگ پای درخت بلوط، تنہی پوسیده‌ی درخت و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۱۰/۵۰	<i>Veigaia nemorensis</i> (Koch, 1836)	Veigaiidae
J.E.D.C.B.A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز، خاک مراعع اطراف جنگل و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۸/۵۱	<i>Veigaia planicola</i> (Berlese, 1882)	
J.I.C.A	خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز، تنہی پوسیده‌ی درخت و خاک پای درختچه‌ی تمشک	۷/۰۶	<i>Prozercon norae</i> (Ujvari, 2011)	Zerconidae
H.E.C.B	خاک مراعع اطراف جنگل، خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت ممرز و خاک مخلوط با خاکبرگ پای درخت کاج	۸/۱۵	Zercon sp.	

\*: نشان‌گر اولین گزارش برای استان آذربایجان شرقی.

پیشرفت، کرمان به خاطر کمکهای بی‌دریغشان در شناسایی و تایید برخی از نمونه‌ها و ارسال مقالات علمی صمیمانه سپاس‌گزاری می‌شود.

### سپاس‌گزاری

از آقای دکتر شهروز کاظمی از گروه تنوع زیستی، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفت و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری

### منابع

ارجمندی ا و کاظمی ش، ۱۳۹۲. فون کنه‌های میان‌استیگماتی (Acari: Mesostigmata) خاکزی پارک‌ها و فضاهای سبز شهر کرمان. صفحه‌ی ۳۵۵ خلاصه مقالات سومین همایش ملی مدیریت آفات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

افتخاری ط. ۱۳۹۴. آینالو و جنگل‌های ارسباران. <http://admin.arianteam.com/content-22337.xhtml>

بیگدلی ع، رحمانی ح و نعمتی ع، ۱۳۹۳. گونه‌هایی از ده خانواده از کنه‌های خاکزی میان‌استیگماتیان (Acari: Mesostigmata) زنجان. صفحه‌ی ۹۹۲ خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره‌ی گیاه‌پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، ایران.

تبزیزی م، شیردل د، عظامهر ا و نیکدل م، ۱۳۹۳. فون کنه‌های خانواده‌ی Phytoseiidae و Laelapidae در جنگل‌های آینالو، شمال آذربایجان شرقی. صفحه‌ی ۹۷۱ خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره‌ی گیاه‌پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، ایران.

زارعی ا و کاظمی ش، ۱۳۹۳. فون کنه‌های میان‌استیگماتی (Acari: Mesostigmata) خاکزی باغ‌های سیب شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان غربی، ایران. صفحه‌ی ۹۸۰ خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره‌ی گیاه‌پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، ایران.

على نژاد د. ۱۳۹۲. منطقه‌ی حفاظت شده‌ی ارسباران. <http://irandeserts.com/378.htm>

مثنوی‌پور م، کاظمی ش، لطیفی م و ضیاء‌الدینی م، ۱۳۹۰. فون کنه‌های میان‌استیگماتی (Acari: Mesostigma) خاکزی در شمال غرب استان کرمان، ایران. صفحه‌ی ۴۱ خلاصه مقالات نخستین کنگره‌ی کنه‌شناسی ایران، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفت و علوم محیطی استان کرمان، ایران.

Germida JJ, Siciliano SD, Renato de Freitas J and Seib AM, 1998. Diversity of root-associated bacteria associated with field-grown canola (*Brassica napus* L.) and wheat (*Triticum aestivum* L.). FEMS Microbiology Ecology 26: 43-50.

Gheblealivand SS, Haddad Irani Nejad K and Akbari A, 2013. A new species record of oribatid mites (Acari: Oribatida) for the Iran mite fauna, from Heyran and Arasbaran regions, Iran. The 2<sup>nd</sup> International Persian Congress of Acarology 68: 12.

Hillel D and Rosenzweig C, 2005. The role of biodiversity in agronomy. Advances in Agronomy 88: 1-34.

Kazemi Sh, 2015. A new species of *Laelaspis* Berlese (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from Iran, with a revised generic concept and notes on significant morphological attributes in the genus. Zootaxa 4044(3): 411-428.

- Kazemi Sh and Duster-Sharaf MM, 2015. First report of the subfamily Myonyssinae (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from Iran. *Persian Journal of Acarology* 4(4): 437-439.
- Kazemi Sh and Kortschan J, 2014. Three new records of the superfamily Uropodoidea (Acari: Mesostigmata: Uropodina) from Iran, and a key to the known Iranian species of Uropodoidea. *Persian Journal of Acarology* 3(1): 9-16.
- Kazemi Sh and Rajaei A, 2013. An annotated checklist of Iranian Mesostigmata (Acari), excluding the family Phytoseiidae. *Persian Journal of Acarology* 2(1): 63-158.
- Kazemi Sh, Rajaei A and Beaulieu F, 2014. Two new species of *Gaeolaelaps* (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from Iran, with a revised generic concept and notes on significant morphological characters in the genus. *Zootaxa* 3861(6): 501-530.
- Lindquist EE, Krantz GW and Walter DE, 2009. Order Mesostigmata. Pp. 124-232 In: Krantz GW and Walter DE (eds.). *A manual of Acarology*. Texas Tech University Press. USA.
- Shamsi MH, Kazemi Sh and Saboori A, 2016. A new Species of the genus *Blattisocius* Keegan (Acari: Mesostigmata: Blattisociidae) from Iran. *Systematic and Applied Acarology* 21(1): 139-145.
- Walter DE and Krantz GW, 2009. Collection, rearing, and preparing specimens. Pp. 83-96 In: Krantz GW and Walter DE (eds.). *A manual of Acarology*. Texas Tech University Press. USA.

## Introduction to Some Edaphic Mesostigmatic Mites (Acari: Mesostigmata) from Arasbaran Forests, North of East Azerbaijan Province

M Mohammad-Dustar-Shara<sup>1</sup>, D Shirdel<sup>2\*</sup> and Sh Mirfakhraie<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Former MSc Student, Department of Plant Protection, Islamic Azad University Tabriz Branch, Tabriz, Iran.

<sup>2</sup>Plant Protection Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran.

<sup>3</sup>Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Urmia.

\*Corresponding author: dshirdel@yahoo.com

Received: 12 Sep 2015

Accepted: 21 May 2016

### Abstract

Order Mesostigmata is one of the largest groups in subclass Acari and its members are important components of natural and agricultural ecosystems. During 2013, fauna of edaphic mesostigmatic mites were collected from soil and plant debris of Arasbaran forests in north of East Azerbaijan province, Iran. Mites were extracted by using Berlese funnels, cleared in Nesbitt's fluid and slides mounted by Hoyer's medium. In this study, 40 species belonging to 32 genera and 18 families were collected and identified. Among the identified species, 20 species were new for East Azerbaijan province fauna. A key for identified taxa has been given. In this study, the family Veigaiidae had the highest relative frequency (19.01%) and the families Zerconidae and Laelapidae with 15.21% and 13.19 frequencies were situated in the next ranks, respectively. The list of identified species are as follows. New records for East Azerbaijan Province mites fauna are marked with one asterisk (\*):

**Ameroseiidae:** *Ameroseius furcatus* (Karg, 1971)\*, *Epicriopsis* cf. *palustris* (Karg, 1971); **Ascidae:** *Zerconopsis michaeli* (Evans & Hyatt, 1960)\*, *Arctoseius semiscissus* (Berlese, 1892)\*, *Asca aphidioides* (Linnaeus, 1758)\*, *A. bicornis* (Canestrini & Fanzago, 1876)\*, *Antennoseius bacatus* (Athias-Henriot, 1961)\*; **Blattisocidae:** *Lasioseius* sp.; **Celaenopsidae:** *Celaenopsis badius* (C.L. Koch, 1839)\*; **Digamasellidae:** *Dendrolaelaps* sp.; **Epicriidae:** *Epicrius* cf. *bulgaricus* (Balogh, 1958); **Laelapidae:** *Laelaspis astronomicus* (Koch, 1839), *Cosmolaelaps lutegiensis* (Shcherbak, 1971), *C. vacua* (Michael, 1891), *Gaeolaelaps aculeifer* (Canestrini, 1884), *G. iranicus* (Kavianpour & Nemat, 2013), *Pseudoparasitus dentatus* (Halbert, 1920)\*, *P. missouriensis* (Ewing, 1909)\*; **Macrochelidae:** *Macrocheles glaber* (Müller, 1860)\*, *Macrolaspis recki* (Bregetova & Koroleva, 1960); **Macrodinychidae:** *Macrodinychus bregetovae* (Hirschmann, 1975)\*; **Melicharidae:** *Proctolaelaps pygmaeus* (Müller, 1860)\*; **Pachylaelapidae:** *Olopachys caucasicus* (Koroleva, 1976)\*, *Onchodellus karawajewi* (Berlese, 1920)\*; **Parasitidae:** *Gamasodes spiniger* (Trägårdh, 1910)\*, *Parasitus copridis* (Costa, 1963)\*; **Phytoseiidae:** *Amblyseius azerbaijanicus* (Abbasova, 1970), *A. nemorivagus* (Athias-Henriot, 1961), *A. sp.*, *Typhlodromus bakeri* (Garman, 1948); **Trachytidae:** *Trachytes* cf. *aegrota* (C.L. Koch, 1841)\*; **Trematuridae:** *Trichouropoda elegans* (Kramer, 1882)\*, *T. ovalis* (Koch, 1839)\*, *Nenteria stylifera* (Berlese, 1904)\*; **Uropodidae:** *Discourella modesta* (Leonardi, 1899), *Uropoda fumicola* (Schweizer, 1961); **Veigaiidae:** *Veigaia nimorensis* (Koch, 1836), *V. planicola* (Berlese, 1882); **Zerconidae:** *Prozercon norae* (Ujvari, 2011), *Zercon* sp.

**Keywords:** Ainaloo, Faunistic survey, Iran, Relative frequency.